HÍBRIDOS DE BRACHIARIA

PAPALOTLA

GRUPO

Semillas Papalotla

Somos líderes en el desarrollo y comercialización de híbridos de pastos tropicales, generados mediante el uso de herramientas avanzadas de mejoramiento genético.

Nuestros materiales se denominan híbridos porque se derivan del cruce de diferentes especies del género Brachiaria. Papalotla produce sus semillas en México para exportar sus ventas en 60 países.

Incrustación EVOLUTION®

Capa protectora con Regent Ultra® (Fipronil+Tiofanato de metilo+ Piraclostrobina) y tratamiento fungicida e insecticida.

La incrustación EVOLUTION® es el proceso mediante el cual las semillas son recubiertas con diversas capas para variar su forma y mejorar su respuesta a determinadas circunstancias adversas.

Este proceso nos permite ofrecerle un producto que facilita el manejo en cualquier método de siembra. Además adiciona sustancias que favorecen la germinación y dan protección a la semilla, permitiendo un mayor contacto con el suelo y garantizando un producto libre de impurezas.

Previo a la incrustación, cada semilla es seleccionada cuidadosamente y sometida a un proceso de escarificación, utilizando nuestro tratamiento patentado Speedygerm®. Esto garantiza el grado más alto de pureza de semilla y potencial de germinación.

Ventajas de la incrustación EVOLUTION®

- Mayor facilidad en la siembra.
- Cantidad precisa de semillas por kilogramo, asegurando un buen establecimiento en la dosis recomendada por área.
- Protege a la semilla en condiciones medioambientales adversas.
- Tratamiento con micronutrientes, fungicida e insecticida, reduciendo riesgos y brindando protección al operador.
- Únicamente se incrustan semillas seleccionadas de primera calidad, evitando el riesgo de introducir maleza a su rancho.
- La cobertura de color específico asegura que nuestros clientes reciban híbridos Papalotla genuinos.

CAMELLO
BLEND

(Brachiaria híbridos GP 3025 + GP3207)

Origen

CAMELLO BLEND® es una mezcla de híbridos seleccionados por su alta tolerancia a la sequía, así como su producción forrajera, valor nutricional y rápido rebrote. Proviene de materiales desarrollados por el CIAT y evaluados por el CIPAT de Grupo Papalotla. Por estas características es considerado una excelente alternativa forrajera para zonas de escasa y errática precipitación, características de algunas zonas tropicales y semiáridas.

Características principales

- Mayor tolerancia a la sequía
- Rápido establecimiento (80 -90 días)
- Mayor productividad y calidad nutricional para producir carne y leche
- Crecimiento postrado después del primer pastoreo
- Mayor protección /menor erosión del suelo
- Precocidad que posibilita más cantidad de pastoreos
- Tolerancia a plagas y enfermedades

Recomendaciones de uso

CAMELLO BLEND® es ideal para sistemas de carne o leche por su alto valor nutricional y palatabilidad. Se adapta muy bien al pastoreo rotacional gracias a su producción y rebrote vigoroso.

El primer pastoreo debe hacerse con becerros entre 80 y 90 días tras la germinación, para estimular el desarrollo de tallos y fortalecer la planta. Se recomienda pastorear por máximo 3 días y descansar de 25 a 35 días la época del año.

¿Por qué un Blend?

Usar una mezcla de híbridos Papalotla mejora la adaptabilidad a distintos suelos y climas, permitiendo tener una cobertura y producción de forraje más estable durante el año. Además de tener un mejor contenido nutricional y palatabilidad para el ganado. Esta mezcla física de híbridos se complementa armónicamente en diferentes aspectos (altura, cobertura, hábito de crecimiento, etc) generando pasturas compactas con buen vigor, desarrollo y excelente calidad nutricional.

CAMELLO
BLEND

(Brachiaria híbridos GP 3025 + GP3207)

*Características de CAMELLO BLEND®	
Nombre comercial	CAMELLO BLEND®
Nombre científico de los componentes	Brachiaria hibrido GP 3025 + Brachiaria hibrido 3207
Hábitos de crecimiento	Semidecumbente
Ciclo de vida	Planta perenne
Producción	27 - 30 ton ha/año MS
Potencial proteico	Hasta 16%
Digestibilidad (invitro)	Hasta 65%
Palatabilidad	Alta
Altura de la planta	80 - 100 cm
Relación hoja tallo	Alta (70:30)
Tolerancia a la sequía	Alta
Tolerancia a encharcamiento	Baja
Densidad de siembra	8 - 10kg/Ha
Días al primer pastoreo	80 - 90 días
Tiempo de rotación (días)	25 - 35 días
Altura mínima para salida de los animales	15 a 20 cm
Requerimiento de fertilidad del suelo	Media - baja
Adaptación en metros sobre nivel del mar	0 - 1400 msnm
Adaptabilidad a suelos con pH ácidos	4.5 -8
Tolerancia al Salivazo	Alta
Usos	Pastoreo, heno, corte y acarreo

*Resultado de los ensayos realizados por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Centro de Investigación en Pastos Tropicales (CIPAT), Universidades e Institutos de Investigación.

CAYMAN
BLEND

(Brachiaria híbridos GP 0423 + CIATGP4009BR)

Origen

CAYMAN BLEND® es una mezcla de híbridos seleccionados por su alta tolerancia a suelos encharcados. Proviene de materiales desarrollados por el CIAT y evaluados por el CIPAT de Grupo Papalotla. Produce raíces adventicias que le permiten soportar hasta 30 días con lamina de agua. Se adapta a suelos pesados con drenaje deficiente, es el único híbrido de Brachiaria en el mercado con esta capacidad comprobada.

Características principales

- Ideal para suelos pesados (arcillosos)
- Proteína: Hasta 18%
- Altamente palatable (facilitando la adaptación y/o consumo del animal)
- Crecimiento semipostrado con tallos estoloniferos (cobertura de suelo)
- Tolerante a la sequía
- Tolerante a enfermedades y plagas
- Rapida recuperación despues del pastoreo

Recomendaciones de uso

CAYMAN BLEND® es ideal para sistemas de carne o leche por su alto valor nutricional y palatabilidad. Se adapta muy bien al pastoreo rotacional gracias a su producción y rebrote vigoroso.

El primer pastoreo debe hacerse con becerros entre 90 y 100 días tras la germinación, para estimular el desarrollo de tallos y fortalecer la planta. Se recomienda pastorear por máximo 3 días y descansar de 25 a 35 días según la época del año.

¿Por qué un Blend?

Usar una mezcla de híbridos Papalotla mejora la adaptabilidad a distintos suelos y climas, permitiendo tener una cobertura y producción de forraje más estable durante el año. Además de tener un mejor contenido nutricional y palatabilidad para el ganado. Esta mezcla física de híbridos se complementa armónicamente en diferentes aspectos (altura, cobertura, hábito de crecimiento, etc) generando pasturas compactas con buen vigor, desarrollo y excelente calidad nutricional.

CAYMAN
BLEND

(Brachiaria híbridos GP 0423 + CIATGP4009BR)

*Características de CAYMAN BLEND®	
Nombre comercial	CAYMAN BLEND®
Nombre científico de los componentes	Brachiaria hibrido GP 0423 + Brachiaria hibrido CIATGP4009BR
Hábitos de crecimiento	Semidecumbente + estolonífero
Ciclo de vida	Planta perenne
Producción	25 - 30 ton ha/año MS
Potencial proteico	Hasta 18%
Digestibilidad (invitro)	Hasta 68%
Palatabilidad	Alta
Altura de la planta	100 - 120 cm
Relación hoja tallo	Alta (70:30)
Tolerancia a la sequía	Alta
Tolerancia a encharcamiento	Alta
Densidad de siembra	8 - 10kg/Ha
Días al primer pastoreo	90 - 100 días
Tiempo de rotación (días)	25 - 35 días
Altura mínima para salida de los animales	15 a 20 cm
Requerimiento de fertilidad del suelo	Media - alta
Adaptación en metros sobre nivel del mar	0 - 1400 msnm
Adaptabilidad a suelos con pH ácidos	4.5 -8
Tolerancia al Salivazo	Alta
Usos	Pastoreo, heno, corte y acarreo

*Resultado de los ensayos realizados por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Centro de Investigación en Pastos Tropicales (CIPAT), Universidades e Institutos de Investigación.

MESTIZO
BLEND

(Brachiaria híbridos CIAT36087 + GP3025 + GP3207)

Origen

MESTIZO BLEND® es una mezcla de híbridos pensado como alternativa a las necesidades de los productores ganaderos del trópico, para establecer praderas altamente eficientes, con mayor potencial productivo, mayor estabilidad en la producción a lo largo del año, tolerancia a plagas, enfermedades y mejor valor nutricional, así como una mejor digestibilidad. Proviene de materiales desarrollados por el CIAT y evaluados por el CIPAT de Grupo Papalotla.

Características principales

- Alto valor nutritivo
- Mayor digestibilidad y palatabilidad
- Mayor producción forrajera
- Buena tolerancia a la sequía
- Mayor biodiversidad forrajera
- Mayor cobertura del suelo
- Mayor digestibilidad
- Buena tolerancia a salivazo.

Recomendaciones de uso

Por su alto valor nutricional y excelente palatabilidad, MESTIZO BLEND® se puede usar en sistemas productivos de carne o leche. Su producción de forraje y gran capacidad de rebrote, hacen que se adapte muy bien a sistemas de pastoreo rotacional.

El primer pastoreo debe hacerse con becerros entre 80 y 90 días tras la germinación, para estimular el desarrollo de tallos y fortalecer la planta. Se recomienda pastorear máximo 3 días y descansar de 25 a 35 días según la época del año.

¿Por qué un Blend?

Usar una mezcla de híbridos Papalotla mejora la adaptabilidad a distintos suelos y climas, permitiendo tener una cobertura y producción de forraje más estable durante el año. Además de tener un mejor contenido nutricional y palatabilidad para el ganado. Esta mezcla física de híbridos se complementa armónicamente en diferentes aspectos (altura, cobertura, hábito de crecimiento, etc) generando pasturas compactas con buen vigor, desarrollo y excelente calidad nutricional.

MESTIZO

BLEND

(Brachiaria híbridos CIAT36087 + GP3025 + GP3207)

*Características de MESTIZO BLEND®	
Nombre comercial	MESTIZO BLEND®
Nombre científico de los componentes	Brachiaria CIAT36087+ Brachiaria hibrido GP3025 + Brachiaria hibrido GP3207
Hábitos de crecimiento	Semidecumbente
Ciclo de vida	Planta perenne
Producción	25 - 30 ton ha/año MS
Potencial proteico	Hasta 19%
Digestibilidad (invitro)	Hasta 68%
Palatabilidad	Alta
Altura de la planta	120 - 150 cm
Relación hoja tallo	Alta (70:30)
Tolerancia a la sequía	Alta
Tolerancia a encharcamiento	Baja
Densidad de siembra	8 - 10kg/Ha
Días al primer pastoreo	80 - 90 días
Tiempo de rotación (días)	25 - 35 días
Altura mínima para salida de los animales	15 a 20 cm
Requerimiento de fertilidad del suelo	Media - alta
Adaptación en metros sobre nivel del mar	0 - 1400 msnm
Adaptabilidad a suelos con pH ácidos	4.5 -8
Tolerancia al Salivazo	Alta
Usos	Pastoreo, heno, corte y acarreo

*Resultado de los ensayos realizados por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Centro de Investigación en Pastos Tropicales (CIPAT), Universidades e Institutos de Investigación.

MULATO II

(Brachiaria Híbrido CIAT 36087)

Origen

Brachiaria híbrido MULATO II® (CIAT 36087) es el resultado de tres generaciones de cruzamiento y selección del CIAT. Es una excelente opción para mejorar la productividad en sistemas semi- intensivos de carne y leche, ideal para suelos ácidos, fertilidad media a alta, sequías prolongadas, altas temperaturas y alta humedad. Además, presenta tolerancia al ataque de salivazo.

Características principales

- Alto valor nutritivo
- Mayor digestibilidad
- Mayor producción forrajera
- Excelente palatabilidad
- Mayor carga animal por hectarea
- Sistema radicular profundo y radiculado
- Tolerante a plagas y enfermedades

Recomendaciones de uso

El pasto híbrido MULATO II® es ideal para climas tropicales y subtropicales, se recomienda sembrarlo en terrenos bien preparados al inicio de la temporada de lluvias (la preparación de terreno se puede hacer con barbecho y 2 pases de rastra cruzada convencional).

Se recomienda que el primer pastoreo (90 a 110 días después de la germinación) se realice con animales pequeños (becerros) para estimular la creación de nuevos tallos y tener plantas más fuertes, para posteriormente realizar el pastoreo rotacional con un periodo de pastoreo máximo de 3 días y un descanso de entre 25 a 35 días, dependiendo la época del año.

MULATO II

(Brachiaria Híbrido CIAT 36087)

*Características de MULATO II®	
Nombre comercial	MULATO II®
Nombre científico de los componentes	Brachiaria Híbrida CIAT 36087
Hábitos de crecimiento	Semidecumbente
Ciclo de vida	Planta perenne
Producción	25 - 30 ton ha/año MS
Potencial proteico	Hasta 18%
Digestibilidad (invitro)	Hasta 65%
Palatabilidad	Alta
Altura de la planta	100 - 150 cm
Relación hoja tallo	Alta (70:30)
Tolerancia a la sequía	Alta
Tolerancia a encharcamiento	Baja
Densidad de siembra	8 - 10kg/Ha
Días al primer pastoreo	90 - 110 días
Tiempo de rotación (días)	25 - 35 días
Altura mínima para salida de los animales	15 a 20 cm
Requerimiento de fertilidad del suelo	Media - alta
Adaptación en metros sobre nivel del mar	0 - 1400 msnm
Adaptabilidad a suelos con pH ácidos	4.5 -8
Tolerancia al Salivazo	Alta
Usos	Pastoreo, corte y heno

*Resultado de los ensayos realizados por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Centro de Investigación en Pastos Tropicales (CIPAT), Universidades e Institutos de Investigación.

COBRA

(Brachiaria Hibrido BR02/1752)

Origen

Brachiaria híbrido COBRA® (BR02/1752) es un híbrido de segunda generación de cruzamientos, el cual proviene de materiales desarrollados por el CIAT y evaluados por el CIPAT de Grupo Papalotla, en donde mostró alto rendimiento, alto valor nutritivo y tolerancia a salivazo. Por sus atributos forrajeros y tras once años de evaluación en Colombia y México, es considerado una especie forrajera de gran potencial productivo.

Características principales

- Hábito de crecimiento erecto.
- Cepas bien definidas que facilitan el corte.
- Excelente calidad nutricional y palatabilidad.
- El más rápido en recuperación dentro de los pastos de corte.
- Ideal para producción de forraje verde para corte y acarreo o para elaboración de heno y ensilaje.
- Tolerante a plagas y enfermedades.

Recomendaciones de uso

El pasto híbrido COBRA® es la mejor alternativa para lograr grandes volúmenes de forraje verde, con mayor proporción de materia seca que cualquier otro y con un mínimo de 12% de proteína cruda (PC), ideal para el corte de pasto en verde o para elaborar heno en pacas o ensilaje.

Además, el pasto COBRA®, bajo sistemas intensivos de producción (riego y fertilización) puede lograr producciones de 6 a 8 kg de forraje verde por metro cuadrado cada 60 días; con esto su gran producción de forraje y calidad lo convierten en una excelente alternativa para ganado de levante o ganado estabulado.

COBRA

(Brachiaria Hibrido BR02/1752)

*Características de COBRA®	
Nombre comercial	COBRA®
Nombre científico de los componentes	Brachiaria hibrida BR02/1752
Hábitos de crecimiento	Erecto
Ciclo de vida	Planta perenne
Producción	35 - 40 ton ha/año MS
Potencial proteico	Hasta 17%
Digestibilidad (invitro)	Hasta 70%
Palatabilidad	Alta
Altura de la planta	120 - 150 cm
Relación hoja tallo	Alta (80:20)
Tolerancia a la sequía	Alta
Tolerancia a encharcamiento	Baja
Densidad de siembra	8 - 10kg/Ha
Días al primer corte	90 - 150 días
Tiempo entre cortes	45 - 55 días
Altura mínima del corte	15 a 20 cm
Requerimiento de fertilidad del suelo	Media - alta
Adaptación en metros sobre nivel del mar	0 - 1400 msnm
Adaptabilidad a suelos con pH ácidos	4.5 -8
Tolerancia al Salivazo	Alta
Usos	Producción intensiva de forraje

*Resultado de los ensayos realizados por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Centro de Investigación en Pastos Tropicales (CIPAT), Universidades e Institutos de Investigación.

OKAPI

(Brachiaria Híbrido CIATGP1005BR)

Origen

Brachiaria híbrido OKAPI® (CIATGP1005BR), anteriormente llamado Confort, es el primer híbrido de Brachiaria seleccionado y lanzado por su alta tolerancia a ambientes SOMBREADOS (hasta 50%).

Proviene del Proyecto de Forrajes Tropicales del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Ofrece también un excelente rendimiento en condiciones de alta luminosidad, siendo ideal para maximizar la producción de forraje de calidad en cualquier entorno.

Características principales

- Tolerante a áreas sombreadas (hasta 50% de sombreamiento).
- Alta producción de MS en sombra y en pleno sol.
- Alto potencial proteico (hasta18%).
- Excelente palatabilidad.
- Alta digestibilidad.
- Crecimiento decumbente.
- Tolerante a plagas y enfermedades.

Recomendaciones de uso

Se recomienda para la siembra en sistemas silvopastoriles, ya sea en plantaciones con árboles maderables, frutales o zonas arboladas.

Para el establecimiento del pasto híbrido OKAPI®, se recomienda realizar podas o aclareos necesarios en las zonas a sembrar para alcanzar el porcentaje de sombra (50%), o manejar una densidad de árboles por hectárea de entre 60 y 150 para garantizar el establecimiento del material, brindándole las condiciones de luminosidad necesarias para su desarrollo.

OKAPI

(Brachiaria Híbrido CIATGP1005BR)

*Características de OKAPI®	
Nombre comercial	OKAPI®
Nombre científico de los componentes	Brachiaria Híbrida CIATGP1005BR
Hábitos de crecimiento	Decumbente
Ciclo de vida	Planta perenne
Producción	30 - 40 ton ha/año MS
Potencial proteico	Hasta 18%
Digestibilidad (invitro)	Hasta 68%
Palatabilidad	Alta
Altura de la planta	90 - 130 cm
Relación hoja tallo	Alta (80:20)
Tolerancia a la sequía	Alta
Tolerancia a encharcamiento	Media
Densidad de siembra	8 - 10kg/Ha
Días al primer pastoreo	90 - 150 días
Tiempo de rotación (días)	25 - 35 días
Altura mínima para salida de los animales	15 a 20 cm
Requerimiento de fertilidad del suelo	Media - alta
Adaptación en metros sobre nivel del mar	0 - 1400 msnm
Adaptabilidad a suelos con pH ácidos	4.5 -8
Tolerancia al Salivazo	Alta
Usos	Pastoreo

*Resultado de los ensayos realizados por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Centro de Investigación en Pastos Tropicales (CIPAT), Universidades e Institutos de Investigación.

SIAMBAZA

(Panicum maximum cv. Mombasa)

Origen

El pasto SIAMBAZA® es un Panicum de alto rendimiento con excelente germinación y pureza varietal debido a su producción artesanal llevada acabo por Papalotla, supervisando el proceso completo desde la siembra hasta la cosecha.

SIAMBAZA® se caracteriza por su excelente pureza varietal y calidad de semilla producida por Grupo Papalotla. En América del Sur, el incremento de ganado alimentado con Siambaza es aproximadamente 770 kg/ha al año.

El pasto SIAMBAZA® produce forraje con abundantes hojas con una incomparable relación hoja/tallo, así como una alta palatabilidad, por lo que es muy adecuado como pasto de corte para alimentar al ganado. Este pasto de alto rendimiento puede producir entre 25 y 35 toneladas de materia seca por hectárea al año.

Características principales

- Rápido establecimiento.
- Mayor producción de pasto por hectárea
- Más carne, más leche por su calidad nutritiva.
- Mayor carga animal.
- Altamente palatable
- Cubre bien el potrero.
- Resistente a enfermedades y plagas (Salivazo).
- Mayor tolerancia al estiaje.
- Densidad de siembra 8 a 10 kg por ha
- Producto NO TRANSGÉNICO
- 12 a 16% proteína cruda
- 27% materia seca
- 90 días al primer corte y subsecuente, dependiendo de la temperatura.

SIAMBAZA

(Panicum maximum cv. Mombasa)

Características de SIAMBAZA®	
Hábitos de crecimiento	Amacollado erecto
Ciclo de vida	Planta perenne
Producción	20 a 25 ton/ha/año MS
Potencial proteico	12 a 14 %
Digestibilidad (invitro)	55 a 60%
Utilización	Pastoreo, corte, heno.
Altura de la planta	1.5 a 2.0 m
Relación hoja-tallo	Media
Salivazo	Resistencia baja
Tolerancia a encharcamiento	Muy baja
Siembra	Al voleo o en surcos
Profundidad de siembra	1 cm máximo
Densidad de siembra	8 kg/ha
Días de establecimiento	De 120 a 150 días
Precipitación	1,000 mm anuales
Altura sobre nivel del mar	De 0 a 1,800 m.
Tipo de suelo	Fertilidad media a alta
Germinación	7 a 14 días
pH	5 a 8

THAIZANIA

(Panicum maximum cv. Tanzania)

Origen

El Pasto THAIZANIA®, requiere suelos bien drenados, de alta Fertilidad, la siembra puede ser al voleo o en surcos separados a 15 x 45 cm.

Siembre cuando el suelo presente condiciones favorables a la germinación y emergencia de las plántulas. Mejores resultados son obtenidos cuando la humedad, temperatura y luminosidad son elevadas, considerando que las semillas de pasto, requieren una profundidad máxima de 1 centímetros.

La semilla debe de tratarse con insecticidas para evitar el acarreo o robo por hormiga o pájaro, se recomienda utilizar Bifentrina + Imidacloprid; Thiodicarb; Tiametoxan , de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Un suelo muy trabajado, puede profundizar en exceso, dicha semilla, razón por lo que se recomienda el uso pre siembra de un pase de llantas o tronco pesado o un riego pesado, para estabilizar el terreno y hacer cama para poder sembrar la semilla. El control de malezas como la hoja ancha se debe realizar a los 30 a 45 días después de la siembra, utilizando algún herbicida del tipo selectivo de hoja ancha en dosis de 1 lt/ha.

Generalmente los suelos tropicales en américa latina, son pobres en N-P-K es por eso que el uso de fertilizantes conteniendo dichos elementos, ayuda a tener un mejor establecimiento, mejor desarrollo y mejor manejo de la pradera, obteniendo más de forraje y de excelente calidad.

Se recomienda hacer un análisis de suelo para determinar con exactitud los componentes del suelo. El primer pastoreo es factible realizarlo a los cuatro o cinco meses después de la siembra cuando se observa que la pradera presenta más de un 90 % de cobertura. Una vez establecido y clima favorable, debe de pastorearse cada 30 días y dejar descansar, fomentando el pastoreo rotacional intensivo y evitar el sobre pastoreo. Resiste una carga animal de 2 a 3 UA por hectárea. Lo comen Bovinos, Ovinos y Equinos.

THAIZANIA

(Panicum maximum cv. Tanzania)

Características de THAIZANIA®	
Hábitos de crecimiento	Amacollado erecto
Ciclo de vida	Planta perenne
Producción	20 a 25 ton/ha/año MS
Potencial proteico	12 a 14 %
Digestibilidad (invitro)	55 a 60%
Utilización	Pastoreo, corte, heno.
Altura de la planta	1.5 a 2.0 m
Relación hoja-tallo	Media
Salivazo	Resistencia baja
Tolerancia a encharcamiento	Muy baja
Siembra	Al voleo o en surcos
Profundidad de siembra	1 cm máximo
Densidad de siembra	8 kg/ha
Días de establecimiento	De 120 a 150 días
Precipitación	1,000 mm anuales
Altura sobre nivel del mar	De 0 a 1,800 m.
Tipo de suelo	Fertilidad media a alta
Germinación	7 a 14 días
pH	5 a 8

COMPACT

HENO PELLETIZADO DE HÍBRIDOS
DE BRACHIARIAS

Origen

Pellet Compact es un producto elaborado a partir de los esquilmos de Brachiarias hibridas, (Mulato II, Cobra y Cayman) las cuales son cortadas y empacadas a una edad de maduración de aproximadamente 150-180 días, para su posterior proceso de pelletizado en el cual se le adiciona el 3 % de melaza.

El tamaño de la partícula de la fibra es el adecuado para estimular el proceso de la rumia.

Características Principales

- Menor incidencia de acidosis ruminal.
- Promueve la proliferación de la flora bacteriana en el rumen, la cual es una importante fuente de proteína.
- Mejor Calidad de Fibra.
- Mayor cantidad de proteína que cualquier otro rastrojo del mercado.
- Excelente palatabilidad.
- Disminución de factores predisponentes a enfermedades respiratorias ya que no presenta tanto polvo.
- Cero aguate: mayor facilidad de manejo por el operador.
- Disminución de costos por menor utilización de mano de obra.
- No hay mermas por concepto de transportación.
- Se integra fácilmente alas raciones con alimentos balanceados.

Sugerencia de uso

- Se puede revolver un bulto de 40kg de compact con un bulto de 40 kg de cualquier alimento con 18 o 20% de proteína para dar a vacas en ordeña o ganado de engorda según sea el propósito.
- Se puede revolver con sales minerales.
- Se puede dar solo, como tal.

El consumo de un bovino va encaminado al 3% de su peso vivo ya que se trata de materia seca (como mínimo 7 kg y como máximo 14 kg.)

COMPACT

HENO PELLETIZADO DE HÍBRIDOS
DE BRACHIARIAS

Características de COMPACT	
Proteína cruda	5-6%
Materia seca	89.2%
Humedad	10.8%
FDN	74.1%
FAD	46.4%
TDN	65%
Digestibilidad	46%
Utilización	Como complemento, solo o combinado con balanceados
Elaborado a partir de	Brachiarias Hibridas y 3% con melaza
Consumo máximo	3% del PV por animal
Presentación	Bultos de 40 kg
Indicado para	Bovinos y Ovinos