



FICHA TÉCNICA PASTO INSURGENTE



PAPALOTLA
GRUPO

Semillas Papalotla



Somos líderes en el desarrollo y comercialización de híbridos de pastos tropicales, generados mediante el uso de herramientas avanzadas de mejoramiento genético.

Nuestros materiales se denominan híbridos porque se derivan del cruce de diferentes especies del género *Brachiaria*. Papalotla produce sus semillas en México para exportar sus ventas en 65 países.


Incrustación EVOLUTION®

Capa protectora con Regent Ultra® (Fipronil+Tiofanato de metilo+ Pira- clostrobina) y tratamiento fungicida e insecticida. La incrustación EVOLUTION® es el proceso mediante el cual las semillas son recubiertas con diversas capas para variar su forma y mejorar su respuesta a determinadas circunstancias adversas.

Este proceso nos permite ofrecerle un producto que facilita el manejo en cualquier método de siembra. Además adiciona sustancias que favorecen la germinación y dan protección a la semilla, permitiendo un mayor contacto con el suelo y garantizando un producto libre de impurezas previo a la incrustación. Cada semilla es seleccionada cuidadosamente y sometida a un proceso de escarificación, utilizando nuestro tratamiento patentado Speedygerm®. Esto garantiza el grado más alto de pureza de semilla y potencial de germinación.

Ventajas de EVOLUTION®

- Mayor facilidad en la siembra.
- Cantidad precisa de semillas por kilogramo, asegurando un buen establecimiento en la dosis recomendada por área.
- Protege a la semilla en condiciones medioambientales adversas.
- Tratamiento con micronutrientes, fungicida e insecticida, reduciendo riesgos y brindando protección al operador.
- Únicamente se incrustan semillas seleccionadas de primera calidad, evitando el riesgo de introducir maleza a su rancho.
- La cobertura de color específico asegura que nuestros clientes reciban híbridos Papalotla genuinos.





Pasto Insurgente

Brachiaria Brizantha Marandu

Descripción y características

El Pasto Insurgente, requiere suelos bien drenados, de mediana Fertilidad. La siembra puede ser al voleo o en surcos separados a 70 cm. La preparación del terreno consistirá en un paso de arado y dos o más de rastra, hasta obtener una buena cama de siembra.

Siembre cuando el suelo presente condiciones favorables a la germinación y emergencia de las plántulas. Mejores resultados son obtenidos cuando la humedad, temperatura y luminosidad son elevadas, considerando que las semillas de pasto, requieren una profundidad máxima de 2 centímetros.

La semilla debe de tratarse con insecticidas para evitar el acarreo o robo por hormiga o pájaro, se recomienda utilizar semevin, cruizer, Allectus o brigadier o semevin, de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Un suelo muy trabajado, puede profundizar en exceso dicha semilla, razón por lo que se recomienda el uso pre siembra, de un rolo, un pase de llantas o tronco pesado o un riego pesado, para estabilizar terreno y hacer cama, para poder sembrar la semilla.

El control de malezas como la hoja ancha, se debe realizar a los 30 a 45 días después de la siembra (dds), utilizando algún herbicida del tipo Pastar o Tordon 101 en dosis ligeras.

Generalmente los suelos tropicales en américa latina, son pobres en N-P-K, Es por eso que el uso de fertilizantes conteniendo dichos elementos, ayuda a tener un mejor establecimiento, mejor desarrollo y mejor manejo de la pradera, obteniendo más forraje de excelente calidad.

Se recomienda hacer un análisis de suelo para determinar con exactitud los componentes del suelo, sin embargo, de manera general se recomienda aplicar 150-80-00 / ha / año.

El primer pastoreo es factible realizarlo a los cuatro meses después de la siembra cuando se observa que la pradera presenta más de un 90 % de cobertura. Una vez establecido y con clima favorable, dejar descansar, fomentando el pastoreo rotacional intensivo y evitar el sobre pastoreo.

Resiste una carga animal de 3 UA por hectárea.





Pasto Insurgente

Brachiaria Brizantha Marandu

Características de Insurgente

Hábitos de crecimiento	Amacollado
Longevidad	Planta perenne
Producción	10 a 13 t/MS/ha/año
Potencial proteico	9 a 12%
Digestibilidad	60%
Utilización	Pastoreo
Altura de la planta	1.2 a 1.5 m
Mosca pinta o salivazo	Tolerancia baja
Tolerancia a encharcamientos	Baja
Siembra	Al voleo o en surcos
Profundidad de siembra	2 cm
Primer pastoreo	120 días después de germinación
Precipitación	Más de 700 mm anuales
Altura sobre nivel del mar	De 0 a 1,500 m
Fertilidad de suelo	Media
pH	5.5 a 8
Germinación	7 a 21 días

